

Augusti

Vem äter vad? Gör ditt eget naturmemory

Facit med kommentarer till naturmemory.



Liljebagge t.v. och tigerlilja t.h.

Liljebaggen är ibland en besvärlig skadeinsekt på odlade liljeväxter i trädgården. Den förekommer från Skåne upp till Västmanland.



Vätteros t.v, hassel t.h.

Vätteros saknar helt klorofyll och lever därför som parasit på olika lövträd t.ex. hassel. Den växer på mullrika marker upp till Dalarna och Gästrikland och blommar i april-maj. Namnet har den fått av att den liksom vättarna lever större delen av sitt liv under jord.

Se Virtuella floran <http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html>.



Hare t.v., kvist med gnag av hare t.h.

Haren livnar sig till stor del på knoppar och bark när marken är snötäckt. Markägare kan fälla buskar och träd av t.ex. sälg och asp för att haren lättare ska få tag i mat under vinterhalvåret.




Ekorre t.v., hasselnötter t.h.

Ekorren äter gärna hasselnötter genom att klyva skalet på mitten. Ekorren samlar förråd av hasselnötter på hösten som den sedan vittjar under vintern.




Klibbticka t.v., brunröta t.h.

Klibbtickan angriper ofta gran. Den är en brunrötesvamp som bryter ner cellulosa vilket innebär att bl.a. det brunfärgade ligninet lämnas kvar och en struktur bildas där veden faller sönder i kuber.



Hackspett t.v, grankotte t.h.

Hackspetten äter gärna grankottsfrön. Kotten får ett tufsigt utseende av skadade och kvarlämnade grankottsfjäll. (Ekorre och skogsmus biter av grankottsfjällen för att komma åt granfrön.)



Sidensvans t.v, rönnbär t.h.

Sidensvansen flyttar söderut under hösten och livnar sig då t.ex. på rönnbär. Rönnbär som jäst och innehåller alkohol kan göra att fåglarna blir påverkade.



Bi t.v., blommande vide (Salix sp.)

Biet som syns på bilden har samlat pollen som det bär med sig på övre delen av det bakre benparet. Viktiga bi-växter på våren är olika videarter t.ex. sälg.